

Real 167 AD

Tamaño: Medio o grande.

Forma: Muy variable: doliforme breve, maliforme, ovoide, esferoidal o turbinada breve. En general sin cuello, a veces en disminución hacia el pedúnculo. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado.

Cavidad del pedúnculo: Muy variable, de anchura media y casi superficial, mamelonada y formando un repliegue en la base del pedúnculo o mas rara vez amplia y de profundidad media. Borde suavemente ondulado o mamelonado. **Pedúnculo:** Corto o medio. Fino o de grosor medio, engrosado en su extremo superior y generalmente carnoso en la base. Parcial o totalmente ruginoso, con lenticelas blanquecinas. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo.

Cavidad del ojo: Generalmente estrecha y poco profunda, con bordes desiguales; a veces anchura media o amplia de profundidad variable y con bordes más fuertemente ondulados. **Ojo:** Pequeño o medio. Regular o irregular. Abierto o semi-cerrado. Sépalos pequeños con puntas rizadas; tomentosos y blanquecinos, o resecos y ennegrecidos. Posición de los sépalos muy variable.

Piel: Lisa o semi-basta, seca. **Color:** Amarillo verdoso o limón con chapa muy leve anaranjado cobrizo o sin chapa. Punteado abundante, grande, ruginoso, muy marcado con aureola verdosa. Ligera zona ruginosa en la base del pedúnculo, no constante, mas rara vez zona más extensa y compacta alrededor del ojo.

Tubo del cáliz: En embudo con conducto sumamente estrecho de longitud variable, generalmente largo.

Corazón: Mediano. Situado generalmente alto. Eje muy amplio. Celdillas grandes, alargadas.

Semillas: Muy grandes. Muy puntiagudas en la inserción, anchas en la base y generalmente bien espolonadas. Color castaño rojizo oscuro.

Carne: Blanco crema. Semi-harinosa, seca. **Sabor:** Astringente, acidulado.

Maduración: Invierno.

