

Bonne de Bry

Tamaño: Pequeño o mediano.

Forma: Redondeado-achatada. Con depresión suave a lo largo de la sutura. Un lado por lo general ligeramente más desarrollado que el otro.

Zona pistilar: Deprimida, con pocillo bastante marcado. **Punto pistilar:** Grande, amarillo dorado con ligera aureola rojiza, elíptico-redondeado. Superficial en una depresión muy marcada. Centrado con relación al eje.

Sutura: Línea muy fina, casi imperceptible. Situada en una depresión muy suave, algo más acentuada en ambos polos.

Cavidad del pedúnculo: Mediana anchura, poca profundidad, medianamente rebajada en la sutura y casi imperceptiblemente en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Longitud media, grueso, muy pubescente.

Piel: Pruina muy abundante, gruesa, azulado-blanquecina. Con pelitos muy difíciles de ver alrededor del punto pistilar. **Color:** Rojo vivo, pasando a morado y casi negro, no suele ser uniforme. Punteado abundante, poco perceptible, en general menudo, blanquecino o amarillento con aureola morada o negra poco perceptible.

Carne: Amarillo ocre claro, transparente. Blanda, muy jugosa. **Sabor:** Dulce, refrescante, ácido con la piel. Muy agradable.

Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en zona ventral. Muy pequeño, redondeado, globoso. Surcos bien marcados, el dorsal con frecuencia interrumpido en su zona media. Caras laterales semi-lisas.

Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

