

Villareta

Tamaño: Medio.

Forma: Variada: Oval y cordiforme oval. Irregulares protuberancias en la cara ventral o deprimida de polo a polo; a veces, dos depresiones notables cerca de su ápice. Rebajado dorsal semi-sesgado o poco notable. Contorno desde oval irregular hasta casi elíptico.

Zona pistilar: Redondeada al mismo tiempo que deprimida, el fruto se tiene en pie. **Punto pistilar:** Pequeño y mediano, de color crema o gris, situado en el mismo eje o desviado hacia la sutura en leve depresión. Con frecuencia presenta un minúsculo orificio.

Sutura: Casi imperceptible. Inicia en suave depresión pasando indistintamente por zona deprimida o abombada. Cerca de su ápice se sitúa entre dos depresiones.

Cavidad peduncular: Relativamente pequeña, rebajada por ambas caras. **Pedúnculo:** Corto, medianamente grueso y ensanchado en sus extremos, con frecuencia presenta estípulas en su extremo.

Piel: Brillante. **Color:** Rojo granate que va oscureciéndose sin llegar a negro. Fondo rosado. Punteado abundante y uniforme picoteado; otros, de color claro aureolado de oscuro. Cuando el fruto no ha alcanzado la intensa coloración, aparecen manchas sin llegar a ser el clásico jaspeado.

Carne: Rosa teñida de rojo. **Sabor:** Acidulado y agradable.

Jugo: Coloreado.

Hueso: Grande. Semi-adherido.

Maduración: Mediados de mayo en San Baudilio de Llobregat (Barcelona).

