

## Utilidad de Laxton

**Tamaño:** Grande o mediano.

**Forma:** Elíptica, ligeramente achatada en ambos extremos, con leve depresión en la zona ventral a lo largo de la sutura. Ligeramente asimétrica.

**Zona pistilar:** Redondeada, deprimida, asimétrica. **Punto pistilar:** Pequeño, blanquecino o amarillento aureolado de rojo oscuro o negro, ligeramente prominente situado en una depresión muy suave.

**Sutura:** Línea violeta muy visible sobre el fondo y casi imperceptible sobre la chapa donde solo se aprecia una fina línea como marcada con un alfiler. Situada en depresión muy leve, algo más acentuada junto a cavidad peduncular.

**Cavidad del pedúnculo:** Estrecha, poco profunda, ligeramente rebajada en la sutura. **Pedúnculo:** Corto, grueso, bien adherido a la carne. Pubescente.

**Piel:** Pruina abundante, irregularmente distribuída, azulada. No se aprecia pubescencia. La mayor parte de los frutos están cubiertos de pequeñas cicatrices lineales, sobre todo en las caras laterales. **Color:** Rojo violeta pasando a casi negro, no uniforme, viéndose zonas rojo fuego más claro y a veces también el color verde oliva del fondo, sobre todo en la zona ventral. Punteado muy abundante de tamaño muy variable, espaciados en el polo peduncular y mucho más espesos en el pistilar. Los más pequeños color violeta sin aureola, los demás blanquecinos con aureola violeta muy marcada, unos y otros destacan mucho sobre el fondo o zonas poco coloreadas, mientras sobre las más oscuras solo destacan los blanquecinos siendo inapreciable su aureola. El punteado unido a las pequeñas cicatrices ruginosas, a veces orladas también de violeta le dan un aspecto muy abigarrado y característico.

**Carne:** Verde claro o amarillo ámbar, transparente. Medio firme, blanda, algo crujiente, muy jugosa. **Sabor:** Medianamente azucarado, refrescante. Muy bueno.

**Hueso:** Semi libre, ligera adherencia en zona ventral. Tamaño medio. Elíptico. Lo más sobresaliente es la zona ventral, en ángulo aproximado de 180 grados y la zona pistilar redondeada. Caras laterales arenosas formando depresión bien acusada a los costados de la zona ventral.

**Maduración:** Segunda-tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

