

## Nota complementaria al artículo «Algunos crustáceos interesantes de las aguas dulces y salobres de España»

por

RAMON MARGALEF

EN la discusión de las afinidades de *Asellus coxalis* subsp. *Gabriellae* nov. subsp., incluida en el artículo citado (*P. Inst. Biol. Apl.*, 7:131-152), no tuve en cuenta un trabajo de CHAPPUIS (1949, Les Asellides d'Europe et pays limitrophes. *Arch. Zool. expér. et gén.*, N. et R., 86:78-94) que conocí con posterioridad a la redacción de mi nota y en el que se encuentran referencias de algunas publicaciones que me son inasequibles.

El criterio de CHAPPUIS coincide con el propio en lo que se refiere a la categoría sistemática atribuida a las distintas formas. El círculo de formas del *A. coxalis*, enumeradas en *loc. cit.*, pág. 143, debe ser completado con las siguientes: *A. coxalis cephalensis* Strouhal, de Cefalonia (Grecia); *A. coxalis corcyracus* Strouhal, de Corfú (Grecia); *A. coxalis cyanophilus* Dudich, de Sicilia; *A. coxalis Dudichi* (Strouhal), de Calabria (Italia); *A. coxalis epiroticus* Strouhal, de Grecia; *A. coxalis leucadius* Strouhal, de la isla Leucas (Grecia); *A. coxalis perarmatus* (Rémy) de la isla Madera; y *A. coxalis Wolfi* (Dudich), de Sicilia.

También se pueden considerar próximas a este grupo, las formas descritas con los nombres de *A. arthrodilus* Braga, de Portugal; *A. Gauthieri* Monod, de Argelia; *A. Gauthieri thermonyctophilus* Monod, de Argelia; *A. hypogeus* Racov., de Argelia; *A. monsferratus* Braga, de Argelia; *A. spelaeus* Racov., del departamento francés de Basses Pyrénées; y *A. spelaeus aquae-calidae* Racov., de otra localidad del mismo departamento.

Por error, las subespecies *italicus* y *polychaetus* del *A. coxalis* llevan, en mi artículo, como nombre de autor, ARCANGELI en vez de DUDICH.