

Abbaye d'Arton

Tamaño: Mediano.

Forma: Ovoide, deprimida en las caras laterales. Un lado generalmente algo más desarrollado.

Zona pistilar: Redondeada, con ligera depresión o aplastamiento hacia la parte dorsal. **Punto pistilar:** Muy pequeño, blanquecino o parduzco, redondeado y con mucha frecuencia con un pequeño orificio en su centro. Superficial en una depresión muy ligera. Muy desviado hacia el dorso.

Sutura: Poco perceptible, línea estrecha de tono casi exacto a la coloración general del fruto. Superficial o en depresión casi imperceptible.

Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y superficial, casi nula. Prácticamente sin rebajar, aunque a veces queda hendida en la sutura.

Piel: Con abundante pruina violácea o azulada. No se aprecia pubescencia. **Color:** Granate oscuro, amoratado o negro, no uniforme, pudiendo verse zonas rosa amoratado más claro y aún a veces el fondo amarillo crema. Punteado muy abundante, tamaño variable, color indefinido con aureola carmín o amoratado bien visible sobre todo en zonas más claras.

Carne: Color amarillo ámbar teñido en parte de carmín sobre todo bajo la piel en la zona de la sutura y junto al hueso. Blanda, pastosa, medianamente jugosa. **Sabor:** Muy dulce, refrescante. Estupendo.

Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en zona ventral. Tamaño mediano o grande. Elíptico, muy aplastado. Surco dorsal profundo, los laterales casi superficiales. Superficie arenosa.

Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

