

Amarillo Temprano 772 AD

Tamaño: Muy grande.

Forma: Acorazonada con un labio más desarrollado en toda su longitud.

Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice muy saliente en forma de mucrón largo y grueso de base muy ancha situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto en sus dos caras y por encima de sus lados laterales. El vértice del mucrón es redondeado con el **punto pistilar** en forma de espina.

Sutura: Variable, ancha y rebajada, superficial con la piel resquebrajada o en forma de surco. Casi siempre teñida del color de la chapa.

Cavidad peduncular: Muy ancha y más bien profunda.

Piel: Velloso de pubescencia abundante y corta de aspecto lanoso. **Color:** Predomina el amarillo anaranjado del fondo. Chapa rojo ciclamen formada por punteado que con intensidad variable recorre casi toda la superficie dejando transparentar el fondo y también zonas considerables libres de chapa y punteado.

Carne: Dura, amarilla, roja junto al hueso. Muy jugosa, suave, granulosa, ligeramente almendrada y astringente. **Sabor:** Muy bueno.

Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su longitud. Surco dorsal ancho y profundo. Superficie arenosa, muy esculpida con surcos largos, anchos y profundos situados por toda la superficie; orificios y surcos cortos en su tercio inferior. Polo peduncular en general abierto.

Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

