

Limonera

Tamaño: Grande.

Forma: Piriforme. Superficie irregular con pequeñas protuberancias, parte inferior ligeramente acostillada. Cuello poco acentuado. Contorno irregular, con tendencia a pentagonal.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha, superficial. Borde irregular, oblicuo con respecto al eje del fruto y con un pequeño mamelón en la parte más alta. **Pedúnculo:** De corto a medio. Gueso o muy grueso, semi-carnoso, engrosado en parte superior. De color verdoso o bronceado con lenticelas cobrizas. Recto. Implantado generalmente oblicuo.

Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Borde muy irregular, fuertemente ondulado o ligeramente acostillado. **Ojo:** Grande, abierto o semi-cerrado. Sépalos triangulares, estrechos y largos con las puntas dobladas indistintamente hacia dentro o hacia fuera. La base de los sépalos es en su parte externa ligeramente rojiza, y entre la unión de los mismos se forman unas pequeñas protuberancias carnosas.

Piel: Lisa y un poco untuosa. **Color:** Amarillo verdoso o amarillo pálido, sin chapa o con ligera chapa mas o menos sonrosada-rojiza. Punteado muy característico, de tamaño medio o grande, abundantísimo en todo el fruto excepto en la zona peduncular donde es más escaso, siendo sin embargo más pequeño y abundante alrededor del ojo; aureola bastante extensa de color verdoso.

Tubo del cáliz: Medio, en forma de embudo redondeado con conducto corto. Los estambres nacen ligeramente separados de la base de los sépalos.

Corazón: Medio, fusiforme. Eje muy largo, ligeramente abierto pero no en toda su extensión. Celdillas muy amplias y grandes.

Semillas: Pequeñas, alargadas, blanquecinas con zonas de color castaño. Muchas abortadas.

Carne: Blanca amarillenta. Medio fundente. **Sabor:** Muy ligeramente alimonado, algo soso pero refrescante y agradable.

Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

