

Garrafal Napoleon

Tamaño: Grande.

Forma: Cordiforme alargada. Deprimida la cara ventral y redondeado abombado el dorso; a veces, aparece una depresión de polo a polo, sólo apreciable al tacto. Transversalmente oval o en forma de "D".

Zona pistilar: Redondeada (el fruto no se tiene en pie). **Punto pistilar:** Superficial, grande y mediano, de color claro y con frecuencia aureolado de rojo.

Sutura: Incolora pero visible, situada sobre zona deprimida.

Cavidad peduncular: Anchura media y relativamente profunda, rebajada en la cara ventral. **Pedúnculo:** De mediana longitud y de grosor más o menos notable, ensanchado en sus extremos.

Piel: Anergaminada y brillante. **Color:** Bicolor. Rojo vivo o rojo oscuro sobre fondo amarillo, con rayas y puntos conspicuos. Punteado abundante, pequeño y del color del fondo, algunos aureolados de rojo oscuro.

Carne: Amarilla blanquecina. Jugosa, fundente. **Sabor:** Acidulado.

Jugo: Abundante e incoloro.

Hueso: Oval-alargado. Adherido frecuentemente por la cresta ventral y generalmente teñido de rojo.

Maduración: Primera quincena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

