

Guindo Jaen

Tamaño: Medianamente pequeño.

Forma: Atonelada, con suave protuberancia en cara ventral y cavidad peduncular. A veces, algunos frutos presentan surco en la parte ventral.

Zona pistilar: Deprimida, los frutos se tienen en pie. **Punto pistilar:** Pequeño o medio, situado en una suave depresión en el mismo eje.

Sutura: Visible por una acusada raya del color de la chapa, transcurre por una protuberancia en la cavidad del pedúnculo y sigue por una zona aplanada hasta el punto pistilar.

Cavidad peduncular: Ancha, poco profunda, rebajada leve o muy inclinada en el dorso y sin rebajar en el contrario; a veces, presenta surco en la cara ventral.

Piel: Fina, brillante y transparente. **Color:** Rojo vivo o rojo granate sobre fondo rojo rosado. Punteado abundante, de tamaño pequeño, repartido uniformemente o bien sólo desde la mitad hasta el ápice, del color de la chapa, semejante a burbujitas.

Carne: Crema-rosada, transparente. Blanda. **Sabor:** Acidulado pero agradable.

Jugo: Abundante, rojo vinoso o asalmonado.

Hueso: Poco adherente, levemente en la parte ventral. Pequeño, más ancho que alto. Arista central ausente y sustituida por una suave ranura. Desde su mitad presenta un saliente que sobrepasa el nivel de la trancadura.

Maduración: Primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

