

362 AD

Tamaño: Mediano.

Forma: Variable, turbinada, turbinada breve, piriforme o doliforme. Cuello variable. Asimétrica. Superficie muy irregular, acostillada con grandes protuberancias y zonas aplastadas, sobre todo en la parte del cuello. Contorno variable, muy irregular, elíptico, redondeado, o con tendencia a pentagonal.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial. Muy irregular, mamelonada. **Pedúnculo:** Corto, grosor variable, fuerte y leñoso, carnoso o semi-carnoso. Ensanchado en su extremo superior formando botón. Ruginoso. Recto. Implantado oblicuo, generalmente ladeado al pie de una gibosidad de desarrollo variable.

Cavidad del ojo: Amplia o mediana. Bastante profunda. Borde muy irregular, fuertemente ondulado, mamelonado o acostillado, pared interior con frecuencia también surcada o acostillada. **Ojo:** Pequeño. Cerrado o semi-cerrado. Sépalos triangulares, pequeños, convergentes, ennegrecidos.

Piel: Fina y lisa o semi-fina, brillante o mate, ligeramente untuosa. **Color:** Amarillo verdoso o pajizo, sin chapa o con chapa de color rojo anaranjado suave, a veces con salpicaduras carmín; la chapa puede llegar a cubrir la tercera parte del fruto. Punteado abundante, menudo, generalmente ruginoso, con aureola verde. Zona ruginosa bastante amplia alrededor de la base del pedúnculo y otra de extensión muy variable, formando anillos alrededor del ojo, sobrepasando a veces la cavidad, extendiéndose formando maraña sobre la parte inferior del fruto.

Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy ancho de longitud variable.

Corazón: Pequeño, redondeado, pedregoso. Eje lanceolado, casi totalmente relleno. Celdillas amplias, elípticas.

Semillas: Muy grandes, elípticas, deprimidas. Punta de inserción muy ancha. Color castaño rojizo oscuro, no uniforme.

Carne: Blanca. Fina, firme, mantecosa, jugosa, granulosa, junto al corazón. **Sabor:** Muy dulce, muy aromático y refrescante.

Maduración: Otoño.

