

965

Tamaño: Medio y pequeño.

Forma: Redondeada u oblonga, con un labio más desarrollado.

Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado con el **punto pistilar** en plano superficial o con una ligera depresión dentro de la cual presenta esbozo de mamelón.

Sutura: Ancha y rebajada; hendida sólo en la cavidad peduncular.

Cavidad peduncular: De anchura variable y poca profundidad.

Piel: Velloso, de pubescencia escasa y corta. **Color:** Amarillo anaranjado. La chapa, de color rojo vinoso, está formada por punteado que, con intensidad variable, cubre sólo un cuarto de la superficie dejando entrever ampliamente el fondo. En algunos frutos, sólo pequeños y suaves toques de punteado.

Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Poco jugosa y poco azucarada, aromática y áspera.

Sabor: Bueno.

Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Cresta ventral saliente. Surco dorsal ancho, profundo e interrumpido alguna vez en la zona ecuatorial. Superficie granulosa, muy esculpida con surcos profundos y cortos, situados preferentemente junto a la cresta ventral, surco dorsal y zona pistilar. El resto de la superficie, con orificios profundos de tamaño diverso intercalados con algún surco corto. Polo peduncular cerrado.

Maduración: Tercera decena de agosto en Galaroza (Huelva).

