

546

Tamaño: Mediano o grande.

Forma: Turbinada, turbinada breve o esferoidal. Sin o con cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno muy irregular.

Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. **Pedúnculo:** Muy largo. Fino, engrosado hacia su extremo y muy ancho y carnoso en la base, con frecuencia formando anillos. Ligeramente curvo. Implantado derecho, como prolongación del fruto u oblicuo al pie de un mamelón.

Cavidad del ojo: Muy amplia, poco profunda. Pared de la cavidad ligeramente acostillada o surcada, borde suavemente ondulado. **Ojo:** Grande. Abierto o semi-cerrado. Sépalos de base carnosa y amarillenta con las puntas ennegrecidas o rotas, posición de los sépalos erectos o convergentes.

Piel: Lisa, brillante, ligeramente untuosa. **Color:** Verde amarillento o dorado con llamativa chapa rojo carmín que llega a cubrir medio fruto. Punteado abundante, ruginoso aureolado de verde o rojo sobre el fondo y carmín más vivo sobre la chapa.

Tubo del cáliz: En forma de embudo cónico con conducto largo o muy largo de anchura media. Estambres carnosos y amarillos muy próximos a la base de los sépalos.

Corazón: Grande, ancho, mal delimitado. Eje muy amplio comunicado con las celdillas, éstas son de tamaño variable.

Semillas: Tamaño mediano. Alargadas con cuello muy largo y retorcido. Color castaño rojizo.

Carne: Blanco-amarillenta, con vetas amarillo verdosas. Medio firme. **Sabor:** Aromático, alimonado, agradable.

Maduración: Tercera decena de agosto (Ibars de Urgel, Lérida).

