

Abre Hueso

Tamaño: Pequeño o muy pequeño.

Forma: Elíptica u ovalada. Generalmente asimétrica, con un lado más largo que el otro. Depresión bastante marcada a lo largo de la línea de sutura, con frecuencia, tan hundida que casi parte el fruto, formando dos labios muy pronunciados. Parte opuesta a la sutura aplastada.

Zona pistilar: Oblicua debido a la asimetría general. Formando un pocillo o depresión bien marcada.

Punto pistilar: Pequeño, pardo o negruzco. Ligeramente prominente. Situado en un pocillo o surco muy acentuado.

Sutura: Muy perceptible por su situación. Hundida parcial o totalmente, en el primer caso, hundido en el tercio superior, y el resto, en depresión más o menos acentuada formando surco o cubeta en el polo pistilar. Algunas veces el surco se prolonga más suavemente en la parte dorsal inferior.

Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, bastante profunda. Muy rebajada en la sutura y levantada en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Corto o mediano. Fino. Sin pubescencia. Bastante adherido al fruto.

Piel: Recubierta de pruina blanquecina. No se aprecia pubescencia. **Color:** Amarillo verdoso o dorado, con manchas atigradas de color oliváceo, más compactas en la zona ventral y en la parte dorsal. Punteado blanquecino, poco perceptible excepto en las zonas atigradas en que es verde.

Carne: Amarillo claro, del mismo tono que la piel, transparente. Blanda, semi pastosa, fibrosa. **Sabor:** Agradable, pero soso.

Hueso: Adherente. Pequeño, elíptico. Zona ventral muy ancha y aplastada. En los frutos en que la sutura está hundida, el hueso se abre por la mitad.

Maduración: Tercera decena de junio (Coín, Málaga).

