

# Andrinas

**Tamaño:** Mediano.

**Forma:** Elíptico alargada. Asimétrica, irregular, ventruda con gran aplastamiento en la parte superior ventral. Algunos frutos con cuello ligero.

**Zona pistilar:** Asimétrica, con protuberancia ladeada, originada por el mayor desarrollo de un lado del fruto. **Punto pistilar:** Pequeño, prominente, amarillento. Situado superficialmente o en un pequeño surco hundido.

**Sutura:** Línea poco perceptible, poco más oscura que el resto del fruto. Bien visible por estar muy recubierta de pruina y a veces por su situación. En algunos casos en depresión muy suave, casi superficial en la parte central, en otros casos en depresión más acentuada en los extremos y a veces en depresión marcada en toda su extensión. Con frecuencia la sutura forma un pequeño surco en el polo pistilar continuando ligeramente en la parte dorsal inferior.

**Cavidad del pedúnculo:** Estrechísima, casi nula. Rebajada en la sutura y levantada en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Corto o medio. Fino. Sin pubescencia.

**Piel:** Recubierta de abundante pruina gruesa, azulado violácea. No se aprecia pubescencia. **Color:** Rojo vinoso muy oscuro pasando a morado o casi negro, uniforme. Punteado menudo, casi imperceptible.

**Carne:** Verde, transparente, consistente, muy jugosa. **Sabor:** Dulce y refrescante, muy bueno.

**Hueso:** Adherente. Grande, elíptico con tendencia a romboidal, muy aplastado. Zona ventral estrecha. Visto de frente asimétrico. Caras laterales bastante labradas, sobre todo en la mitad inferior.

**Maduración:** ¿julio, agosto? (Sanlúcar la Mayor, Sevilla).

