

Angelina Burdett

Tamaño: Mediano o grande.

Forma: Semi globosa con tendencia a trapezoidal. Con depresión bastante marcada en la zona ventral. Ligeramente asimétrica, un lado algo más desarrollado.

Zona pistilar: Redondeado deprimido o dividido por la sutura. **Punto pistilar:** Pequeño, blanquecino. Ligeramente prominente en un estrecho surco formado por la sutura. Ligeramente desviado hacia la parte dorsal.

Sutura: Poco perceptible de no ser por su situación y estar muy recubierta de pruina. En depresión mediana en toda su extensión, hundida junto a cavidad peduncular y a veces también en el polo pistilar.

Cavidad del pedúnculo: Amplia, casi superficial. Medianamente rebajada en la sutura y sin rebajar en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Longitud y espesor medianos. No se aprecia pubescencia.

Piel: Abundantemente recubierta de pruina azulada. Sin pubescencia. **Color:** Morado casi negro uniforme o ligeramente rojizo, no deja ver nada del fondo. Punteado abundante, grande, ruginoso y como hundido.

Carne: Amarillo ámbar claro o ligeramente verdoso, transparente, teñida de rojo bajo la piel. Medio firme, muy jugosa. **Sabor:** Extraordinariamente dulce, con ligero aroma a albaricoque.

Hueso: Semi libre, con ligera adherencia en zonas ventral y dorsal. Tamaño mediano, elíptico alargado, semi globoso. Parte de la cresta ventral sobresaliente, surcos generalmente poco acusados. Superficie arenosa.

Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

