

## Burton

**Tamaño:** Grande o muy grande.

**Forma:** Elíptico alargada a veces formando algo de cuello en la zona peduncular. En general ventruda y a veces deprimida en las caras laterales. Asimétrica, con un lado más desarrollado.

**Zona pistilar:** Redondeada, asimétrica. **Punto pistilar:** Pequeño, amarillento, prominente en una depresión muy ligera. Situado en una pequeña zona completamente libre de pruina y de color rojo vivo. Desviado hacia la parte dorsal.

**Sutura:** Línea muy fina, apenas marcada. Situada en depresión ligera en la parte central ventral y hasta el punto pistilar y completamente superficial en el tercio superior.

**Cavidad del pedúnculo:** Estrechísima y apenas pronunciada. Más levantada en el lado opuesto de la sutura por lo que queda oblicua. **Pedúnculo:** Largo, fino, algo curvo. Sin pubescencia.

**Piel:** Recia, con abundante pruina azulado-violácea. Pubescencia fácilmente perceptible alrededor del punto pistilar. **Color:** Rojo claro, rojo oscuro, amaratado o casi negro, todo ello mezclado, nunca uniforme. También a veces se deja entrever el fondo amarillo anaranjado. Por lo general la parte más oscura es la zona peduncular. Punteado muy abundante, de tamaño variable, amarillento o ruginoso con aureola carmín vivo en las zonas de coloración más clara.

**Carne:** Color amarillo calabaza. Medio firme, poco jugosa. **Sabor:** Muy dulce. Estupendo si se quita la piel.

**Hueso:** Semi-libre, adherente en zona ventral y más rara vez en caras laterales. Tamaño mediano o grande. Elíptico. Forma variable, en general asimétrica. Zona ventral muy marcada, a veces muy ancha y plana. Surcos muy poco marcados. Superficie arenosa semi-lisa con mucha frecuencia como corroída.

**Maduración:** Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

