

Climax

Tamaño: Grande.

Forma: Globosa ligeramente cordada. Con depresión ligera en zona ventral a lo largo de la sutura. Ligeramente asimétrica.

Zona pistilar: Redondeada con una protuberancia poco marcada, generalmente ladeada y desviada hacia la parte dorsal. **Punto pistilar:** Mediano o pequeño, amarillo crema, rodeado de pequeñas cicatrices ruginosas formando dibujos estrellados. Superficial en una depresión casi imperceptible. Muy desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto.

Sutura: Línea ancha de color carmín vivo muy visible en los frutos poco coloreados y destacando en claro sobre la chapa oscura. Situada en depresión muy suave, algo más acentuada junto a cavidad peduncular.

Cavidad del pedúnculo: Muy amplia, estrechándose bruscamente en forma de embudo, bastante profunda. Bastante rebajada en la sutura y más suavemente en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Longitud media, gruesos y fuertes de aspecto leñoso. Sin pubescencia.

Piel: Poco pruinosa, pruina violácea. Sin pubescencia. **Color:** Amarillo ámbar que se va cubriendo de rosa, rojo claro o granate oscuro, nunca uniforme. Estrías más claras partiendo de la cavidad peduncular. Punteado muy abundante, tamaño variable, blanquecino con aureola verdosa sobre el fondo y de tono rojo algo más oscuro que la zona donde se encuentre sobre la chapa. Pequeñas cicatrices ruginosas amarillentas recubriendo todo el fruto, sobre todo en las caras laterales.

Carne: Amarillo calabaza claro, transparente. Semi-firme o blanda. Muy jugosa. **Sabor:** Muy aromático, dulce y refrescante. Muy bueno. Típico de Japonesa.

Hueso: Adherente. Pequeño o medio. Elíptico, truncadura muy amplia, zona pistilar apuntada. Asimétrico. Surcos dorsal y laterales poco marcados y discontinuos, sustituidos con frecuencia por orificios muy profundos. Pequeños surcos partiendo de la truncadura. Superficie arenosa, más labrada junto a polo pistilar.

Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

