

# Early Transparent

**Tamaño:** Pequeño o mediano.

**Forma:** Redondeado-achatada. Con depresión mas o menos acusada en la parte ventral y muy ligera en el tercio inferior dorsal. Asimétrica, con un lado ligeramente mayor

**Zona pistilar:** Deprimida y asimétrica. **Punto pistilar:** Grande, cobrizo-dorado claro. Superficial en un pocillo bastante marcado. Ligeramente desviado hacia la parte dorsal.

**Sutura:** Bien visible, línea de color verdoso indefinido, transparente. En depresión mas o menos acusada en toda su extensión.

**Cavidad del pedúnculo:** Anchura media, poca profundidad. Medianamente rebajada en la sutura y casi imperceptiblemente en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Mediano o largo, fino, pubescente.

**Piel:** Pruina blanquecina, muy abundante en las depresiones y ligera en el resto. Sin pubescencia. **Color:** Amarillo verdoso o dorado con estrías y manchas amarillentas que parten de la cavidad peduncular. Chapa variable en salpicaduras no uniformes de color granate o rojo violeta. Abundante punteado de tamaño diverso, blanquecino sin aureola, perceptible sobre el fondo mientras que sobre la chapa es granate oscuro.

**Carne:** Color calabaza claro o amarillo dorado, transparente. Blanda, algo pastosa, bastante jugosa.

**Sabor:** Agridulce y refrescante. Estupendo.

**Hueso:** Adherente. Pequeño. Redondeado, semi-globoso. Surco dorsal interrumpido en la parte central, los dorsales bastante marcados. Superficie semi-rugosa.

**Maduración:** Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza),

