

Fraila Morada

Tamaño: Medio o grande.

Forma: Elíptica alargada. Depresión bastante acusada en zona ventral junto a cavidad peduncular, dicha depresión sigue muy atenuada a lo largo de la línea de sutura desapareciendo totalmente en el polo pistilar, gran parte de los frutos son dobles o provienen de flores dobles, teniendo en este caso la parte ventral hundida y son muy defectuosos. Se describen solamente frutos normales.

Zona pistilar: Redondeada. **Punto pistilar:** Mediano o grande, amarillento, superficial. Ligeramente desviado hacia el dorso en relación con el eje del fruto.

Sutura: Línea poco marcada, color violeta, perceptible a primera vista por estar recubierta de pruina. En una depresión bien marcada junto a cavidad peduncular, mucho más ligera en la parte central, y superficial en la zona pistilar.

Cavidad del pedúnculo: Anchura media, muy poca profundidad. Medianamente rebajado en la sutura, sin rebajar en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Medio o largo, fino. Pubescente. Fuertemente adherido a la carne.

Piel: Pruina abundante, de distribución irregular, azulado-violácea. Sin pubescencia. **Color:** Violeta rojizo llegando a ponerse casi negro, no uniforme con zonas cobrizas o violeta claro y viéndose en varias ocasiones el color verde del fondo. Punteado abundante menudo. Blanquecino, con aureola violeta rojiza imperceptible en las zonas más oscuras.

Carne: Amarillo claro ambarino, transparente. A primera vista parece verdosa debido al color oscuro de la piel. Medio firme, ligeramente crujiente, medianamente jugosa. **Sabor:** Poco dulce. Agradable.

Hueso: Ligeramente adherente en zona ventral y caras laterales. Mediano o grande. Elíptico. Surcos bien marcados. Superficie ligeramente escabrosa.

Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

