

Fraile Roig

Tamaño: Mediano o pequeño.

Forma: Muy alargada, en forma de gota. Disminuyendo de anchura hacia el polo peduncular, indistintamente con o sin cuello. Ventruda y por el contrario algo aplanada en la parte dorsal.

Zona pistilar: Redondeada o dividida por la sutura formando en este caso dos ligeras protuberancias.

Punto pistilar: Muy pequeño, superficial o prominente. Situado superficial sobre el ápice redondeado o en una ligera depresión en forma de surco. Muy desviado hacia el dorso en relación con el eje del fruto. Con frecuencia frutos hendidos en el mismo punto pistilar.

Sutura: Línea rosa, indistintamente más clara o más oscura que la epidermis, según el grado de coloración de ésta. Muy recubierta de pruina. Superficial o en una ligera depresión a veces más acentuada en el cuello y polo pistilar.

Cavidad del pedúnculo: Casi nula, oblicua, rebajada en la sutura y levantada en el lado opuesto.

Pedúnculo: Largo, fino, verdoso. Muy pubescente.

Piel: Muy pruinosa, pruina violácea. Sin pubescencia. **Color:** Rosa ciclamen pasando a rojo carmín o amoratado, no uniforme, a veces se ve parte del fondo ambarino o verdoso. Punteado abundante, sobre todo en caras laterales, tamaño diverso, amarillento aureolado de carmín o morado, más oscuro que la zona en que se encuentra.

Carne: Amarillo calabaza. Semi-firme, pastosa, poco jugosa. **Sabor:** Dulce, aromático, bueno.

Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en zona ventral. Grande, estrecho y largo, muy plano. Asimétrico. Surco dorsal amplio con labios dentados. Los surcos laterales menos acusados. Zona ventral muy estrecha. Superficie semi-lisa, áspera.

Maduración: Segunda quincena de julio (Perreras, Baleares).

