

Heron

Tamaño: Mediano o grande.

Forma: Redondeado achatada. Asimétrica con un lado bastante más desarrollado que el otro. Con dos protuberancias bien acusadas junto a cavidad peduncular a los lados de la sutura.

Zona pistilar: Deprimida y asimétrica. Con protuberancia ladeada originada por el desigual desarrollo de los lados del fruto. **Punto pistilar:** Pequeño. Blanquecino o amarillento aureolado de rojizo o casi negro. Generalmente superficial en una depresión bien acusada.

Sutura: Fina, línea como marcada por un alfiler, casi imperceptible de no ser por estar muy recubierta de pruina. En depresión ligera, acentuada en los dos extremos.

Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medianas. Bastante rebajada en la sutura y casi sin rebajar en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Longitud y anchura medianas, engrosado en su parte alta. Muy adherente a la carne.

Piel: Con pruina muy abundante violácea, más espesa sobre la sutura y en cavidad peduncular. No se aprecia pubescencia. **Color:** Muy abigarrado, rara vez uniforme, mezclado el morado o negro de la chapa con el ambarino del fondo que no desaparece sino en maduración muy avanzada. Punteado abundante. Pequeño amoratado o blanquecino con aureola morada, perceptible sobre el fondo y casi imperceptible sobre la chapa.

Carne: Amarilla clara. Semi-blanda, crujiente, algo pastosa, poco jugosa. **Sabor:** Agradable aunque algo soso.

Hueso: Libre o semi-libre. Grande. Elíptico-redondeado. Surcos discontinuos. Polo pistilar muy amplio. Superficie escabrosa con frecuentes orificios junto al borde dorsal.

Maduración: Segunda, tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

