

## Kentish Bush

**Tamaño:** Pequeño o mediano.

**Forma:** Elíptico redondeada, asimétrica. Con depresión suave en zona ventral y cubeta en polo pistilar.

**Zona pistilar:** Achatada, con un pocillo pequeño pero muy marcado. **Punto pistilar:** Pequeño, blanquecino, generalmente superficial en una depresión estrecha y no en su centro sino apoyado en la parte dorsal a la terminación de la sutura.

**Sutura:** Prácticamente inapreciable. En depresión casi superficial en zona peduncular y ventral central y bastante más acusada en el polo pistilar.

**Cavidad del pedúnculo:** Estrecha, poco profunda, poco rebajada en la sutura. **Pedúnculo:** Corto, fino, pubescente.

**Piel:** Pruina abundante, azulado-blanquecina, más espesa en zonas ventral y pistilar. Pubescencia en la zona pistilar. **Color:** Morado oscuro tachonado de manchas más rojizas y brillantes o verdosas. Punteado abundante de tamaño variable, cobrizo claro no se aprecia aureola.

**Carne:** Calabaza claro o verdoso. Medio firme, algo pastosa, medianamente jugosa. **Sabor:** Soso y sin aroma.

**Hueso:** Adherente. Pequeño o mediano. Elíptico redondeado. Surco dorsal casi superficial en la mitad superior y limitado por dos labios salientes en la inferior. Surcos laterales poco marcados. Superficie arenosa, semi-lisa.

**Maduración:** Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

