

Warwickshire Drooper

Tamaño: Mediano o grande.

Forma: Elíptico-redondeada, con la anchura máxima por debajo de la línea media. Asimétrica, un lado bastante más desarrollado que el otro, sobre todo en el tercio inferior.

Zona pistilar: Asimétrica, redondeada o ligeramente aplastada. **Punto pistilar:** Mediano o grande, elíptico, grisáceo. Superficial sobre cara plana o en depresión suave pero extensa. Ligeramente desviado hacia el dorso.

Sutura: Poco visible, color indefinido transparente. Superficial o en depresión muy suave en toda su extensión o más comúnmente superficial en los dos tercios superiores y en depresión leve en el inferior y zona pistilar.

Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Apenas rebajada en la sutura. **Pedúnculo:** Corto o medio, generalmente grueso, fuerte, leñoso, con escudete pequeño y carnoso fuertemente adherido a la carne. Pubescente.

Piel: Muy fuerte, basta, apergaminada, frecuentemente con zonas o maraña acorchada. Poco pruinosa, muy fina, blanquecina. Sin pubescencia. **Color:** Amarillo verdoso o calabaza dorado con estrías y manchas amarillentas, transparentes que parten de la cavidad peduncular. Chapa compuesta por puntos y manchas carmín vivo o rosa de extensión variable. Punteado abundante, generalmente pequeño, amarillo-blanquecino con aureola verdosa o sin aureola.

Carne: Color calabaza fuerte. Semi-blanda, pastosa o harinosa. **Sabor:** Bueno.

Hueso: Adherente. Mediano o grande. Elíptico, semi-globoso. Zona ventral muy ancha. Surcos poco marcados, el dorsal limitado en su mitad inferior por bordes dentados o con orificios, los laterales casi superficiales sobre una cresta prominente. Superficie arenosa.

Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

