

1837

Tamaño: Medio.

Forma: Ovoide o cilíndrica. Anchura máxima por debajo de la mitad, rebajada de un lado. Contorno, con frecuencia, oblongo.

Cavidad del pedúnculo: Relativamente estrecha y poco profunda, en algunos frutos es mas bien superficial con carnosidad lateral unida con el pedúnculo que le da una forma característica; en el resto de los frutos, presenta fondo con chapa ruginosa de tono cobrizo, mas o menos amplia y desbordada. **Pedúnculo:** Corto, fino y leñoso.

Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias, fruncida mas o menos notablemente y de bordes suavemente ondulados, a veces rebajados de un lado. **Ojo:** Pequeño o intermedio. Cerrado o un poco abierto. Sépalos triangulares, separados en su base y con las puntas vueltas, de color verde y con tomento.

Piel: Fina, semi brillante. **Color:** Amarillo yema tirando a ocre con reflejos verdosos. Chapa en zona de insolación mas o menos amplia, de color rosa con tenues pinceladas de la misma tonalidad, aunque algo más vivo o, en algún fruto, exento de ellas.

Tubo del cáliz: Pequeño, cónico alargado o triangular, con los estambres situados mas bien por debajo de su mitad.

Corazón: Alargado e irregular, desplazado hacia el pedúnculo. Eje abierto. Celdas estrechas y cortas o alargadas.

Semillas: Pequeñas.

Carne: Color crema. Fundente, un poco jugosa, a veces se vuelve algo harinosa. **Sabor:** Suavemente acidulado pero dulzón.

Maduración: Invierno.

